



東勢區葡萄推薦用藥

○病徵、傳播途徑、防治方法

○葡萄安全容許量

○政府歷年禁用農藥一覽表



○梨推薦用藥【本資料轉載自】

行政院農業委員會 農業藥物毒物試驗所 > 植物保護 > 植物保護手冊 > 果樹病蟲害 > 進入*****【以下可從網頁下載柑桔、梨、柿、葡萄、桃、花卉、梅、特用做物】

○農藥殘留安全容許量查詢

衛生福利部食品藥物管理署 > 法規資訊 > 食品、餐飲及營養類 > 序 6 殘留農藥安全容許量標準（另開視窗）

作物類別：點選 梨果類 小漿果 柑桔類

農產品：點選 梨桃柿 葡萄 柑桔



東勢區農會 102 年 11 月 20 日 下載印製

葡 萄

一、葡 萄 銹 病

學名：*Phakopsora ampelopsidis* Diet. et Syd.

英名：Rust

病徵：

葉背呈現多數小突起，秋季時產生黃褐色粉末狀物為本菌夏孢子，病斑多時可引起落葉。

傳播途徑：以夏孢子為本病之感染源。

防治方法：任選下表一種藥劑防除

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施 藥 方 法	注 意 事 項
50%三氟敏 水分散性粒劑 (Trifloxystrobin)	0.2公斤	6000	發病初期開始施藥，以 後每隔7-10天施藥一次 ，連續三次。	1.採收前18天停止用藥。 2.對水生物具毒性，勿使用 於「飲用水水源水質保護 區」及「飲用水取水口一 定距離內之地區」。
75%四氯異苯腈 可濕性粉劑 (Chlorothalonil)		600	發病初期開始噴藥，每 隔10天噴藥一次，連續 四次。	1.採收前30天停止用藥。 2.本藥劑試驗時加展著劑「 出來通CS-7」3000 倍。
75%四氯異苯腈 水分散性粒劑 (Chlorothalonil)		600	發病初期開始噴藥，每 隔10天噴藥一次，連續 四次。	1.採收前30天停止用藥。 2.本藥劑試驗時加展著劑「 出來通CS-7」3000 倍。
75%嘉保信 可濕性粉劑 (Oxycarboxin)	1公斤	1500	發病初期開始每隔7天 施藥一次。	採收前20天停止施藥。
75%貝芬普寧 可濕性粉劑 (Carbendazim + Mepronil)	0.8公斤	1500	發病初期開始施藥，以 後每隔10天施藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑 「全透力」1000倍或「 CS-7」3,000倍。 2.採收前18天停止施藥。
25%克熱淨溶液 (Quazatine)	1.5-1.9 公升	800	發病初期開始每隔10天 施藥一次，連續四次。	1.本藥劑試驗時添加展著 劑「出來通CS-7」3,000 倍。 2.採收前21天停止用藥。



二、葡萄黑痘病

學名：*Elsinoe ampelina* (De B.) Shear

英名：Anthracnose

病徵：

可危害葉、嫩枝及果。果及莖上病斑為圓形，中央稍凹陷呈灰白色，周圍深暗褐色或鮮紅色或紫色，猶如鳥眼，故又鳥眼病。

傳播途徑：本菌於被害部越冬，依靠分生孢子傳播。

防治方法：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
34.5%貝芬菲克利水懸劑 (Carbendazim + Hexaconazole)	0.3-0.4公升	3,000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續三次。	採收前9天停止施藥。
40%甲基多保淨水懸劑 (Thiophanate-methyl)		1,500	發病初期開始施藥一次，以後每隔7-10天施藥一次，連續四次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對水生物中等毒。
41.7%貝芬替水懸劑 (Carbendazim)		2,000	發病初期開始施藥一次，以後每隔7-10天施藥一次，連續四次。	1.採收前21天停止施藥。 2.對水生物劇毒。
53%腐絕快得寧可濕性粉劑 (Thiabendazole + Oxine-copper)	1公斤	1,200	自新芽萌發後開始施藥，以後每隔10-12天施藥一次，連續四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑自然油 (Natural oil) 1500倍。 2.採收前6天停止施藥。 3.對水生物劇毒。
27.12%三元硫酸銅水懸劑 (Tribasic copper sulfate)	1.5公斤	800	休眠期新芽未萌發前施藥一次，自新芽萌發果穗形成後，每隔7天施藥一次，連續五至七次。	採收前6天停止施藥。
15%易胺座可濕性粉劑 (Imibenconazole)		3,000	發病初期開始施藥，以後每隔7-10天施藥一次，連續三次。	採收前3天停止施藥。
80%鋅鋁乃浦可濕性粉劑 (Mancozeb)	1.5-2.0公斤	600	發病初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次，連續四次。	採收前20天停止施藥。



三、葡萄白粉病

學名：*Uncinula necator* (Schw.) Burrill

英名：Powdery mildew

病徵：

在嫩枝及幼果上產生白色或灰白色粉狀物。嫩葉表面初生白色後轉灰白色粉狀物。受害後生育受影響。被害果有些易裂開而腐爛。本菌可在被害部越冬。

傳播途徑：依靠分生孢子傳播，多發生於春秋二季。

任選下表一種藥劑防治：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
9%邁克諾芬水懸劑 (Myclobutanil + Quinoxifen)	0.3-0.5公升	1,600	發病初期開始施藥，必要時隔10天施藥一次，連續3次。	1.採收前15天停止施藥。 2.具呼吸中等毒。
15%得克芬胺乳劑 (Tebuconazole + Cyflufenamid)		2,000	幼果發病開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續3次。	1.採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。 2.具強眼刺激性、中度皮膚刺激性。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
42.37%滅芬農水懸劑 (Metrafenone)	0.3公升	4,000	發病初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次，連續3次。	1.採收前21天停止施藥。 2.具呼吸中等毒。 3.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
11.8%護汰芬水懸劑 (Flutriafol)		2,000	發病初期開始施藥，以後每隔7至10天施藥一次，連續3至4次。	1.採收前14天停止施藥。 2.具中至輕度口服急毒性、中等呼吸急毒性及嚴重眼刺激性。
11.6%四克利水基乳劑 (Tetraconazole)	0.8公升	1,500	發病初期開始噴藥，以後每隔7天噴藥一次，連續四次。	採收前15天停止施藥。
17.9%依瑞菲克利水懸劑 (Hexaconazole + Ethirimol)	0.3公升	4,000	發病初期開始施藥，每隔7至10天施藥一次，連續三至四次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對眼具中度刺激性。
30%賽福座可濕性粉劑 (Triflumizole)	0.4公斤	3,000	發病初期開始施藥，每隔7至10天施藥一次，連續三至四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑組展(Kumiten) 3000倍。 2.採收前9天停止施藥。 3.對眼具中度刺激性，對皮膚略具敏感性。



藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
22.8%菲克利腐絕水懸劑 (Hexaconazole + Thiabendazole)	1.2公升	1,000	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續二至三次。	採收前6天停止施藥。
35.15%銅合硫磺水懸劑 (Sulfur + Copper oxychloride)	2公升	600	發病初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次，連續三次。	採收前6天停止施藥。
5%達克利可濕性粉劑 (Diniconazole-M)	0.4公斤	3000	發病初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次，連續三次。	採收前6天停止施藥。
5%三泰隆可濕性粉劑 (Triadimenol)	1公斤	1200	發病初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次，連續三次。	採收前3天停止施藥。
20.8%比芬諾乳劑 (PyrifenoX)	0.15-0.2公升	6000	發病初期開始施藥，每隔7天至10天施藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑60%力道威(SANDOVIT) 2,000倍。 2.採收前9天停止施藥。
5%菲克利水懸劑 (Hexaconazole)	0.3-0.4公升	3000	發病初期開始施藥，每隔7天至10天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
37%護砂得乳劑 (Flusilazol)		8000	發病初期開始噴藥，每隔10天用藥一次，共計三至四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑60%「CS-7」3000倍。 2.採收前6天停止施藥。
10.5%平克座乳劑 (Penconazole)	0.2-0.3公升	5500	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，共三至四次。	1.採收前6天停止施藥。 2.本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3000倍。 3.勿任意提高藥劑濃度以免對幼果產生藥害。
40%邁克尼可濕性粉劑 (Myclobutanil)		12000	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3000倍。 2.採收前15天停止施藥。
50%免賴得可濕性粉劑 (Benomyl)	0.3-0.4公斤	3000	1.發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，共計二至三次。 2.許多地區之白粉病菌對免賴得已有抗藥性，不可單獨使用免賴得，應與蟎離丹互用。	
25%蟎離丹可濕性粉劑 (Oxythioquinox)	0.8公斤	1500		



藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
11.76%芬瑞莫乳劑 (Fenarimol)	150公撮	8000	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，共三~四次。	採收前9天停止施藥。
52%可濕性硫黃水懸劑 (Sulfur)	1.5公升	800	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，共三~四次。	採收前9天停止施藥。
25%撲克拉乳劑 (Prochloraz)		6000	發病初期開始施藥，每隔10天噴藥一次共二~三次。	1.採收前9天停止施藥。 2.本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3,000倍。
25%撲克拉水基乳劑 (Prochloraz)		6000	發病初期開始施藥，每隔10天噴藥一次共二~三次。	1.採收前9天停止施藥。 2.本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3,000倍。
5%三泰芬可濕性粉劑 (Triadimefon)		2000	發病初期開始施藥，每隔10天噴藥一次共二~三次。	1.採收前6天停止施藥。 2.本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3,000倍。



四、葡萄晚腐病

學名：*Glomerella cingulata* (Ston.) Spauld. Et Schrenk

英名：Ripe rot

病徵：

近收穫或收穫時被害嚴重。病徵可自果粒大小如豆粒時出現，呈丹形赤褐色稍凹陷，後擴及果實全部組織。表面著生多數黑粒並分泌淡紅色粘汁，為本病病菌分生孢子。果肉軟腐，皮皺而落果，收穫後仍繼續發生。傳播速度極快。

防除方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
31.6%貝芬撲克拉 濃懸乳劑 (Carbendazim + prochloraz)	0.48公升	2,500	開花後每隔10天施藥一次。	1.採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。 2.對眼中度刺激性。
38%白列克敏 水分散性粒劑 (Pyraclostrobin + boscalid)		1,200	開花盛期開始施藥，以後每隔7-10天施藥一次，連續6-7次。	1.採收前18天停止施藥。 2.呼吸中等毒。 3.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
50%保粒微素(甲) 水溶性粒劑 (Polyoxins)		3,000	開花初期開始施藥，以後每隔7-10天施藥一次，連續四至五次。	對水生物具中等毒性。
10%亞托敏水懸劑 (Azoxystrobin)		800	開花初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次。	1.採收前30天停止施藥。 2.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
62.5%賽普護汰寧 水分散性粒劑 (Cyprodinil + Fludioxonil)		1,500	謝花後開始施藥，以後每隔7-10天施藥一次，連續四次。	採收前12天停止施藥。
44.2%克收欣 水懸劑 (Kresoxim-methyl)	0.6公升	2,000	開花初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
50%撲克拉錳 可濕性粉劑 (Prochlorate Manganese)		6,000	開花初期開始，每隔10天噴藥一次，連續七次。	1.本藥劑試驗時加展著劑 Triton CS-7，每1000公升藥液加2公升。 2.採收前9天停止施藥。
16.5%滅紋乳劑 (MALS)	4-5公升	200	於休眠期及發芽前，各施藥一次。	採收前1週停止施藥。



藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%撲克拉 水基乳劑 (Prochloraz)		2,500	開花後每隔10天噴藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「CS-7」3,000倍。 2.對果粒房枯病亦有防治效果。 3.用藥不當時,可能影響果實風味或產生異味。 4.採收前21天停止施藥。
25%撲克拉乳劑 (Prochloraz)		2,500	開花後每隔10天噴藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「CS-7」3,000倍。 2.對果粒房枯病亦有防治效果。 3.用藥不當時,可能影響果實風味或產生異味。 4.採收前21天停止施藥。
25.9%得克利 水基乳劑* (Tebuconazole)	0.5-1.1 公升	1,500	開花初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,至套袋前為止。	採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.4-0.8 公升	2,000	發病初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,至套袋前為止。	採收前6天停止施藥。
23.7%依普同 水懸劑* (Iprodione)	1-2 公升	800	開花初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,至套袋前為止。	採收前12天停止施藥。
70%甲基多保淨 可濕性粉劑* (Thiophanate-methyl)	0.8-1.6 公斤	1,000	開花初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,至套袋前為止。	採收前6天停止施藥。
16%晴硫克敏 水分散性粒劑* (Pyraclostrobin + Dithianon)	0.5-1.1 公斤	1,500	開花初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,至套袋前為止。	採收前12天停止施藥。
23.6%百克敏乳劑* (Pyraclostrobin)	0.3-0.5 公升	3,000	開花初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,至套袋前為止。	採收前12天停止施藥。
40%克熱淨 (烷苯磺酸鹽) 可濕性粉劑* (Iminoctadine tris (albesilate))	0.5-1.1 公斤	1,500	開花初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,至套袋前為止。	採收前21天停止施藥。
80%免得爛 水分散性粒劑* (Metiram)	1.6-3.2 公斤	500	開花初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,至套袋前為止。	採收前6天停止施藥。
50%三氟敏 水分散性粒劑* (Trifloxystrobin)	0.2-0.4 公斤	4,000	開花初期開始施藥,必要時隔7天施藥一次,至套袋前為止。	採收前18天停止施藥。



藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
53%腐絕快得寧 可濕性粉劑* (Thiabendazole + Oxine-copper)	0.7-1.3 公斤	1,200	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，至套袋前為止。	採收前6天停止施藥。
42.2%腈硫醃 水懸劑* (Dithianon)	0.7-1.3 公升	1,200	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，至套袋前為止。	採收前9天停止施藥。
80%鋅鋁乃浦 可濕性粉劑* (Mancozeb)	2-4 公斤	400	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，至套袋前為止。	採收前30天停止施藥。
33%鋅鋁乃浦 水懸劑* (Mancozeb)	1.3-2.7 公升	600	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，至套袋前為止。	採收前15天停止施藥。
80%鋁乃浦 可濕性粉劑* (Maneb)	2-4 公斤	400	開花初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次，至套袋前為止。	採收前30天停止施藥。

*延伸使用藥劑



五、葡萄露菌病

學名：*Plasmopara viticola* (Berkeley et Curtis) Berlese et de Toni

英名：Downy mildew

病徵：

危害葉片、新梢花穗及果梗。發生於多濕時期，被害葉之葉背呈現白霉狀或呈角斑，後者中間部轉褐色，病斑多時易引起落葉，花穗被害時呈水浸狀，使其無法結果，危害果梗使果粒脫落。

傳播途徑：被害部所生白粉有孢囊，藉游走子傳播。

防治方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
75%鋅鋁座賽胺 水分散性粒劑 (Mancozeb + Zoxamide)		1,200	發病初期開始施藥，每隔7-10天噴藥一次，最多四次。	1.採收前21天(設施栽培27天)停止施藥。 2.具呼吸中等毒、皮膚中度刺激性及皮膚中度過敏性。 3.對水生物具毒性，勿使用於「自來水水質水量保護區」及「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。
34%鹼氣氫氧銅 水懸劑 (Copper oxychloride + Copper hydroxide)		600	發病初期開始施藥，每隔7-10天噴藥一次，最多四次。	1.不可於開花期內施藥。 2.不可與強鹼物質或含有得恩地或鈣的產品混合使用。 3.具呼吸中等毒性。
500g/L達滅芬 水懸劑 (Dimethomorph)		4,000	夏果自花期開始，冬果則於萌芽後3個展開葉開始施藥，每隔7天噴藥一次，連續三次。	1.採收前15天(設施栽培21天)停止施藥。 2.具口服及呼吸中等毒。
65%鋅鋁曼普胺 水分散性粒劑 (Mandipropamid + Mancozeb)		600	夏果自花期開始，冬果則於萌芽後3個展開葉開始施藥，每隔10-14天噴藥一次，連續三次。	1.採收前21天(設施栽培27天)停止施藥。 2.具呼吸中等毒、中度皮膚過敏性。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。



藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
17.7%安美達 水懸劑 (Amisulbrom)	0.3公升	4,000	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續三次。	1.採收前12天(設施栽培18天)停止施藥。 2.具呼吸中等毒、中度眼刺激性；對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。 3.與其他藥劑輪流施用可避免抗藥性。
69%鋅錳右本達樂 可濕性粉劑 (Mancozeb + Benalaxyl-M)	1-1.2公斤	1,000	發病初期開始施藥，每隔7-10天施藥一次，連續三至四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1,000倍噴施。 2.採收前18停止施藥。
68.75%(w/v) 氟比拔克水懸劑 (Fluopicolide + Propamocarb hydrochloride)		1,200	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次。	1.採收前30天停止施藥。 2.具呼吸中等毒。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
18.7%達滅克敏 水分散性粒劑 (Pyraclostrobin + dimethomorph)	1-1.2公斤	1,000	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次。	1.採收前15天停止施藥。 2.具中等呼吸急毒性及中度皮膚刺激性。
52.5%凡殺克絕 水分散性粒劑 (Famoxadone + cymoxanil)		2,500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續四次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具中度眼刺激性。 3.對水生物劇毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
9.4%賽座滅 水懸劑 (Cyazofamid)		3,000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續四次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具呼吸中等毒。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
80%福賽快得寧 可濕性粉劑 (Fosetyl-Al + Oxine-copper)		1,600	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「來著通CS-7」3,000倍。 2.採收前6天停止施藥。 3.對水生物具毒性，禁用於水域、空中施藥或大面積施用。
29.69%三元銅克絕 水懸劑 (Tribasic copper sulfate + Cymoxanil)	1.5公升	800	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續三次。	採收前6天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
64%甲鋅殺斯可濕性粉劑 (Propineb + oxadixyl)	2公斤	600	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次。	採收前21天停止施藥。
23%亞托敏水懸劑 (Azoxystrobin)	0.6公升	2,000	發病初期開始施藥，以後每隔7-10天施藥一次，連續三至四次。	採收前6天停止施藥。
50%達滅芬可濕性粉劑 (Dimethomorph)	0.3公斤	4,000	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次。	1.採收前15天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高。
50%達滅芬水懸劑 (Dimethomorph)	0.3公斤	4,000	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次。	1.採收前15天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高。
48%快得克絕可濕性粉劑 (Oxine-copper + Cymoxanil)	1.6公斤	750	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續四次。	採收前6天停止施藥。
93%克絕波爾多可濕性粉劑 (Cymoxanil + Basic copper sulphate)	1.8-2.0公斤	600	發病初期開始，每隔7天施藥一次，共四次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對水生生物劇毒。
71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑 (metalaxyl + Copper Oxychloride-M)	1.8-2.0公斤	600	發病初期開始，每隔10~14天施藥一次，共三~四次。	採收前21天停止施藥。
35%睛硫克絕可濕性粉劑 (Cymoxanil + Dithianon)	0.9-1.0公斤	1,200	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，共四次。	採收前9天停止施藥。
71%鋅錳比芬諾可濕性粉劑 (Pyrifenoxy + Mancozeb)	1.8-2.0公斤	600	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，共四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑60%力道威(SANDOVIT) 2,000 倍。 2.採收前21天停止施藥。
80%福賽得水分散性粒劑 (Fosetyl-Al)	1.3公斤	800	發病初期開始施藥，每隔7至10天施藥一次，共四至六次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3000 倍。 2.採收前18天停止施藥。
80%福賽得可濕性粉劑 (Fosetyl-Al)	1.3公斤	800	發病初期開始施藥，每隔7至10天施藥一次共四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3000 倍。 2.採收前18天停止施藥。



藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
73%鋅波爾多 可濕性粉劑 (Basic copper sulfate + Basic zinc sulfate)	1.3公斤	800	發病初期開始施藥，每隔7至10天施藥一次，共四至六次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3000倍。 2.採收前6天停止用藥。
65%松香酯銅乳劑 (Copper salt of Fatty & Rosin Acid)	1.2公升	1000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，共計三~四次。	
76.5%銅滅達樂 可濕性粉劑 (Metalaxyl + Copper oxy-chloride)	1.2公斤	1000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，共計三~四次。	採收前21天內停止施藥。
72%鋅錳克絕 可濕性粉劑 (Mancozeb + Cymoxanil)	1.3-2.0 公斤	750	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前14天內停止施藥。
33.5%快得寧 水懸劑 (Oxine-copper)	0.8公升	1500	發病初期開始，每隔7~10天施藥一次，共三~四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1000倍噴施。 2.採收前12天停止施藥。
73%鋅錳本達樂 可濕性粉劑 (Mancozeb + Benalaxyl)	1-1.2 公斤	1000	發病初期開始，每隔7~10天施藥一次，共三~四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1000倍噴施。 2.採收前18天停止施藥。
64%鋅錳毆殺斯 可濕性粉劑 (Mancozeb + Oxadixyl)	2.0-2.4 公斤	500	發病初期開始，每隔7~10天施藥一次，共三~四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1000倍噴施。 2.採收前25天停止施藥。
53%鋅錳右滅達樂 水分散性粒劑 (Mancozeb + Metalaxyl-M)	2.5公斤	400	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，共四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1000倍。 2.採收前24天停止施藥。
58%鋅錳滅達樂 可濕性粉劑 (Mancozeb + Metalaxyl)	2.5公斤	400	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，共四次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1000倍。 2.採收前24天停止施藥。



六、葡 萄 葉 斑 病

學名：*Alternaria alternata*

英名：*Alternaria leaf spot*

病徵：

本病主要於高溫多濕時由成熟葉片開始發生。初期葉片產生針頭狀褐色小斑點，病斑周圍淡化，後期病斑擴大，形成褐色乾枯壞死組織。

傳播途徑：病斑上產生黑色分生孢子，是為感染源。

防治方法：

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施 藥 方 法	注 意 事 項
80%免得爛 可濕性粉劑 (Metiram)	1.3-2.0 公斤	750	發病初期開始施藥，每 隔7天施藥一次，共三 次。	1.本藥劑試驗時添加展著 劑「全透力」1000倍。 2.做好田間管理(枝葉不得 重疊茂密，應使通風良 好，日照充足)。 3.採收前6天停止施藥。
25%克熱淨溶液 (Iminoctadine triacetate)	1.5-1.9 公升	800	發病初期開始施藥，每 隔10天噴藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「 出來通CS-7」3,000 倍。 2.採收前21天停止施藥。



七、葡萄苦腐病

學名：*Greeneria uvicola* Punithalingam

英名：Bitter rot

病徵：

本病危害葉片、枝條及果實，葉片罹病時初期呈細點型黑色病斑，以後逐漸擴大形成紅褐色或黑褐色塊斑，周圍偶有黃暈，其上著生大量黑點是為分生孢子堆。枝條罹病時呈灰褐色或紅褐，在與健全組織交接處呈黑色，並稍有凹陷。每年5、6月間，氣溫轉高時病枝從下位葉開始掉落，並向上枯萎終至死亡，果實罹病初期出現針頭狀細小斑點，以後病勢進展停止，至糖度約12 Brix 以上才嚴重發生。夏果5月上旬至9月上旬，冬果11月下旬至12月下旬。

傳播途徑：

初感染源來自罹病枝條，隨雨水傳播，造成二次感染。目前栽培之巨峰、義大利、金香、黑后等均為感病品種。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
65%貝芬得 可濕性粉劑 (Carbendazim + Metiram)		1,000	自萌芽後開始噴藥，每隔7至10天噴藥一次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「出來通CS-7」3,000倍。 2.採收前18天停止用藥。



八、葡 萄 根 瘤 線 蟲

學名：*Meloidogyne incognita* (Kofoed et White) Chitwood

Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood

英名：Root-knot nematode

病徵：

本線蟲二齡幼蟲侵染葡萄植株根部引起明顯的腫狀根瘤，往往數個腫瘤連結成疣塊狀，引起根系腐敗，影響根部對營養分吸收，易造成微量元素缺乏症。

傳播途徑：本線蟲以卵塊或幼蟲殘存於土中或其他寄主植物。



九、葡萄黃毒蛾

學名：*Euproctis taiwana* (Shiraki)

英名：Tussock moth

生活習性：

寄主甚廣，可在多種果樹、蔬菜及雜糧作物危害。年發生八至九世代，周年可見。成蟲晝伏夜出，卵產于葉背，卵塊成帶狀，20~80粒一塊，分為二排，上蔽黃尾毛。幼蟲初齡棲葉背，剝食葉肉，僅留表皮，二至三齡各自分散自葉緣危害。6~7月發生密度較高。幼蟲之毛有劇毒，觸之皮膚發生紅腫癢痛。

危害特徵：剝食葉肉造成不規則洞孔或缺刻，亦可啃食果實或花朵。

防除方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
75%硫敵克 可濕性粉劑 (Thiodicarb)	0.3-0.5 公斤	3000	害蟲發生時，施藥一次。	1.採收前14天停止施藥。 2.施藥者應戴口罩、手套以防藥劑吸入體內及沾及皮膚。
24%納乃得溶液 (Methomyl)	1-1.2 公升	1000	害蟲發生時，施藥一次。	1.採收前8天停止施藥。 2.施藥者應帶口罩、手套以防藥液吸入體內及沾及皮膚。



十、葡萄蝦殼天蛾

學名：*Agrius convolvuli* (Linnaeus)

英名：Palearctic sweet potato hornworm

生活習性：

自4月開始至葡萄落葉為止，均見其幼蟲危害葉片，其中以5、6月發生密度較高。成蟲晝間潛伏，黃昏以後開始活動。卵散產於寄主葉背，幼蟲自葉緣蠶食葉片，僅留葉柄，食量甚大。老熟幼蟲即潛入離地面6~9公分之土內化蛹。成蟲之飛翔力極強，捕獲時發出一種尖銳之聲，以示威嚇。

危害特徵：幼蟲自葉緣蠶食葉片，形成不規則之缺刻或僅留葉柄。

防除方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40.64%加保扶水懸劑 (Carbofuran)	1公升	1200	害蟲發生時，每隔15天施藥一次，連續二次。	採收前20天停止施藥。



十一、葡萄咖啡木蠹蛾

學名：*Zeuzera coffeae* Nietner

英名：White borer, Coffee borer

生活習性：

中部地區年發生兩世代，以4~5月發生密度最高，9~10月次之。成蟲產卵於葉柄基部或枝幹表面隙縫間，每20-30粒一處，每一雌蟲可產300-800粒。初孵化幼蟲由穗軸，嫩枝或腋芽間蛀入莖內危害，幼蟲有遷移他枝繼續蛀食之習性。老熟幼蟲化蛹於食孔中。

危害特徵：幼蟲蛀食於莖內木質部，致枝條枯萎，糞便由進入孔排出。

防除方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.8%第滅寧乳劑 (Deltamethrin)	0.5公升	2000	害蟲發生時，每隔15天施藥一次，連續三次。	採收前15天停止施藥。
2.8%第滅寧 水基乳劑 (Deltamethrin)	0.5公升	2000	害蟲發生時，每隔15天施藥一次，連續三次。	採收前15天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑 (lambda- Cyhalothrin)	1公升	1000	成蟲發生時，每隔15天施藥一次，連續三次。	採收前20天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液 (lambda- Cyhalothrin)	1公升	1000	成蟲發生時，每隔15天施藥一次，連續三次。	採收前20天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑 (lambda- Cyhalothrin)	1公升	1000	成蟲發生時，每隔15天施藥一次，連續三次。	採收前20天停止施藥。
40.64%加保扶 水懸劑 (Carbofuran)	1公升	1200	成蟲出現時，每隔15天施藥一次，連續二次。	採收前20天停止施藥。



十二、葡萄捲葉蛾 (螟蛾)

學名：*Sparganothis pilleriana* (Denis et Schiffermuller)

英名：Vine leaf moth

生活習性：

雌成蟲黃褐色，前翅有二條顯明褐色斑帶，體上稍有絨毛；幼蟲頭部綠褐色，蟲體綠色背面有黑點條紋。年發生三～四世代，成蟲於春季3～4月間及秋季9～10月間新芽出現時產卵於嫩葉表面，卵成塊狀，並以成蟲絨毛覆蓋呈褐黃色，每雌蟲產卵約180個。幼蟲分散於嫩葉。

危害特徵：

老熟幼蟲將附近葉片捲成筒狀，棲息其中化蛹。本蟲亦可將花芽枝條蕊部及幼果啃害，影響生長及開花結果。



十三、葡萄神澤氏葉蟎

學名：*Tetranychus kanzawai* Kishida

英名：Kanzawa spider mite

危害作物：葡萄、豆類、茄子、桑、茶等於近60種植物。

生活習性：

主要分布在葉被，成蟎紅色，幼期綠色或黃綠色，以口針刺吸汁液為害植株。

危害特徵：

因其破壞葉綠素，葉表可見白色之為害斑。能影響葉片生長，嚴重時影響植株生育。

防除方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.8%畢芬寧乳劑 (Bifenthrin)		1,000	於每葉達五隻葉蟎時，每隔14天施藥一次，連續二次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對水生物劇毒，水域禁用。
2.5%畢芬寧水懸劑 (Bifenthrin)		1,000	於每葉達五隻葉蟎時，每隔14天施藥一次，連續二次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對水生物劇毒，水域禁用。
11%合賽芬普寧 乳劑 (Fenpropathrin + Hexythiazox)		2,000	葉蟎密度每葉達5隻(含卵)以上時，開始施藥一次。	採收前21天停止施藥。



十四、葡萄赤腳青銅金龜

學名：*Anomala cupripes* Hope

英名：Red-legged cupreous chafer, Large green chafer beetle

危害作物：葡萄、橡果、柑桔、甘蔗、黃麻、相思樹等。

生活習性：

年發生一代，成蟲出現於5~10月間，6月和7月間為羽化高峰。成蟲於夜間活動取食，具群棲性，喜食新葉片。幼蟲棲於土中取食腐植質或植物根部。

危害特徵：

成蟲為害新芽和葉片，幼蟲危害根部，造成植株發育不良或黃萎枯死。早春葡萄受害時導致不抽花穗或落果。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
48.34%丁基加保扶乳劑 (Carbosulfan)	0.4公升	2,500	成蟲出現時，施藥一次。	採收前15天停止施藥。
48.34%丁基加保扶水基乳劑 (Carbosulfan)	0.4公升	2,500	成蟲出現時，施藥一次。	採收前15天停止施藥。



十五、葡萄薊馬類

姬黃薊馬

學名：*Scirtothrips dosalis* Hood

英名：Yellow tea thrips

危害作物：雜食性，較重要寄主包括柑桔類、葡萄、茉莉、玫瑰、非洲菊、大理花等作物。

生活習性：

棲息於植物幼嫩部位，易發生於初萌發的新葉或花苞與幼果間，乾燥季節密度較高，若蟲與成蟲在嫩葉背面中肋兩旁或附近，爬行活動及吸食植物汁液。

危害特徵：

銼食花部影響花器發育；危害幼果時促使果實表面銼傷，成熟果形成疤痕。危害葉片可造成葉片黃化，嚴重被害新葉皺縮捲曲。

花薊馬

學名：*Thrips hawaiiensis* (Morgan)

英名：Hawaiian flower thrips

生活習性：

每年發生23世代左右，每逢葡萄開花時期，吸引附近其他植物上的花薊馬飛來，在花器產卵繁殖，因此開花期密度急遽升高。

危害特徵：

葡萄開花期花薊馬聚集花部銼吸及產卵，開花初期危害會影響著果率，開花末期剛形成的幼果表皮因被薊馬銼吸而產生傷痕。

南黃薊馬

學名：*Thrips palmi* Karny

英名：Melon thrips、Palm thrips

危害作物：雜食性，較重要寄主包括葡萄、瓜類、茄子、茉莉、玫瑰、非洲菊、大理花等作物。

生活習性：

害蟲全年發生，葡萄抽新梢至長嫩葉期間及乾燥溫暖的季節，害蟲密度會提高，若蟲與成蟲於新梢或嫩葉葉背活動並吸食植物汁液；另於葡萄開花後，危害幼果造成損失。

危害特徵：

此蟲於葡萄開花時聚集於花與幼果上活動，危害幼果外皮。果實長大後，受害處的表皮細胞出現增生、畸形、硬化、褐化等徵狀，成熟果實外皮會形成不規則、略呈圓形之疤痕。葉片遭危害後呈現細微斑點，嚴重時導致葉片黃化，受害嚴重之新葉則皺縮捲曲或萎凋。

腹鉤薊馬

學名：*Rhipiphorothrips cruentatus* Hood

英名：Grape thrips、Waxapple thrips

危害作物：雜食性，寄主作物包括蓮霧、葡萄、檬果、番石榴、玫瑰等。

生活習性：

本蟲主要發生於較成熟的葉片及果實上，成蟲、若蟲大多聚集於葉背，銼傷葉片及果實表皮，吸食汁液危害。

危害特徵：



被害部呈赤褐色疤痕。嚴重時葉片銹化、乾枯而捲曲，果實形成粗糙傷疤而發育不良，影響葡萄生長及產量。而本蟲排出之蜜露亦會污染葉片，嚴重時造成黃化及落果，對光合作用及生育都會有影響。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
100g/L賜派滅水懸劑 (Spirotetramat)	0.5-0.7 公升	1,500	花穗形成至幼果期前， 均勻施藥一次，隔7天 再施藥一次，共二次。	1.採收前14天(設施栽培20 天)停止施藥。 2.具呼吸中等毒性、中度 皮膚過敏性。 3.對水生物具毒性，勿使 用於「自來水水質水量 保護區」及「飲用水水 源水質保護區」或「飲 用水取水口一定距離內 之地區」。
28.8%益達胺溶液 (Imidacloprid)	0.15-0.25 公升	6,000	薊馬發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次，連 續二次。	1.採收前12天(設施栽培18 天)停止施藥。 2.具口服、呼吸中等毒性 ，對眼具中度刺激性。
20%達特南 水溶性粒劑 (Dinotefuran)	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 7天後再施藥一次，連 續二次。	1.防治葡萄南黃薊馬。 2.採收前9天停止施藥。 3.具呼吸中等毒；對蜜蜂 劇毒。
20%亞滅培 水溶性粉劑 (Acetamiprid)	0.3-0.4 公斤	4,000	害蟲發生初期開始施藥 ，每隔7天施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.具中等呼吸急毒性。



十六、葡萄夜蛾類

斜紋夜蛾

學名：*Spodoptera litura* (Fabricius)

英名：Cotton leafworm、Tabacco cutworm

危害作物：雜食性，包括蔬菜、果樹、花卉等多種作物。

生活習性：

一年約發生八代，以一年生葡萄幼株受害較嚴重，受害部位多為接近地面葉片。雌蛾常產卵塊於葉背，每個卵塊約含100-400粒卵，卵塊上披覆暗黃色尾毛。幼蟲老熟後會潛入植株附近土中化蛹，白天多隱藏於葡萄園之枯葉及地表隱匿處。

危害特徵：

一、二齡幼蟲會聚集在葉片下方取食，取食後會殘留表皮，使葉片呈透明食痕或孔洞，三齡幼蟲會逐漸分散取食，且食量增大，嚴重受害的葉片呈大面積缺刻或僅剩葉柄與葉脈。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
19.7%得芬諾水懸劑 (Tebufenozide)	0.5-0.6公升	2,000	結果期蟲害發生初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次。	採收前30天停止施藥。
10%克凡派水懸劑 (Chlorfenapyr)	1.0-1.2公升	1,000	結果期蟲害發生初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次。	1.採收前30天停止施藥。 2.具口服、皮膚及呼吸中等毒性。 3.對鳥類、蜜蜂毒性高。 4.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。



十七、葡萄葉蟬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%依殺蟬水懸劑 (Etoxazole)	0.3-0.4 公升	4,000	害蟬發生時，全株噴施一次。	1.採收前21天(設施栽培27天)停止施藥。 2.具呼吸劇毒、皮膚中等毒。 3.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。



葡萄 農藥殘留安全容許量

項次	國際普通名	普通名稱	作物類別	容許量(ppm)	備註
1	2,4-D	二·四地	葡萄	0.1	殺草劑
2	Abamectin	阿巴汀	小漿果類	0.02	殺蟲劑
3	Acephate	毆殺松	其他	0.05*	殺蟲劑
4	Acetamipri	亞滅培	葡萄	1.0	殺蟲劑
5	Acrinathrin	阿納寧	葡萄	2.0	殺蟎劑
6	Alachlor	拉草	其他	0.01*	殺草劑
7	Allethrin	亞烈寧	其他	0.01*	殺蟲劑
8	Ametryn	草殺淨	小漿果類	0.5	殺草劑
9	Amisulbror	安美速	葡萄	2.0	殺菌劑
10	Azinphos-r	谷速松	小漿果類	0.5	殺蟲劑
11	Azoxystrob	亞托敏	小漿果類	2.0	殺菌劑
12	Benalaxyl	本達樂	小漿果類	0.5	殺菌劑
13	Bendiocarb	免敵克	其他	0.01*	殺蟲劑
14	Benfluralin	倍尼芬	其他	0.01*	殺草劑
15	Bentazone	本達隆	其他	0.01*	殺草劑
16	Bifenazate	必芬蟎	葡萄	1.0	殺蟎劑
17	Bifenox	必芬諾	其他	0.01*	殺草劑
18	Bifenthrin	畢芬寧	其他小漿果	1.0	殺蟲劑
19	Bitertanol	比多農	其他	0.05*	殺菌劑
20	Boscalid	白克列	葡萄	1.0	殺菌劑
21	Bromoprop	新殺蟎	其他	0.02*	殺蟎劑
22	Bupirimate	布瑞莫	其他	0.03*	殺菌劑
23	Buprofezin	布芬淨	葡萄	0.5	殺蟲劑
24	Butachlor	丁基拉草	其他	0.01*	殺草劑
25	Butocarbo	佈嘉信	其他	0.01*	殺蟲劑
26	Butralin	比達寧	其他	0.05*	殺草劑
27	Captan	蓋普丹	葡萄	25.0	殺菌劑
28	Carbaryl	加保利	小漿果類	0.5	殺蟲劑
29	Carbendaz	貝芬替	葡萄	3.0	殺菌劑
30	Carbofuran	加保扶	小漿果類	2.0	殺蟲劑
31	Carbosulfate	丁基加保扶	小漿果類	2.0	殺蟲劑
32	Chinometh	蟎離丹	小漿果類	0.2	殺蟎劑
33	Chlorantranil	剋安勃	葡萄	1.0	殺蟲劑
34	Chlorfenapyr	克凡派	葡萄	0.5	殺蟲劑
35	Chlorfluazur	克福隆	其他	0.03*	殺蟲劑
36	Chlorothaloxyl	四氯異苯肼	小漿果類	0.7	殺菌劑
37	Chlorpyrifos	陶斯松	小漿果類	1.0	殺蟲劑
38	Chlorpyrifos	甲基陶斯松	其他	0.03*	殺蟲劑
39	Clothianidin	可尼丁	葡萄	1.0	殺蟲劑
40	Cryolite		葡萄	7.0	殺蟲劑
41	Cyazofamid	賽座滅	葡萄	1.0	殺菌劑
42	Cyflufenar	賽芬胺	葡萄	0.2	殺菌劑
43	Cyhalothrin	賽洛寧	小漿果類	1.0	殺蟲劑
44	Cymoxanil	克絕	小漿果類	1.0	殺菌劑
45	Cypermethrin	賽滅寧	小漿果類	2.0	殺蟲劑
46	Cyproconazole	環克座	其他	0.01*	殺菌劑
47	Cyprodinil	賽普洛	葡萄	2.0	殺菌劑
48	Deltamethrin	第滅寧	小漿果類	0.2	殺蟲劑
49	Diazinon	大利松	小漿果類	0.5	殺蟲劑
50	Dichlofluanil	益發靈	小漿果類	10.0	殺菌劑
51	Dicloran	大克爛	葡萄	7.0	殺菌劑

葡萄 農藥殘留安全容許量

52	Difenoconazole 待克利	小漿果類	1.0	殺菌劑
53	Diflubenzu 二福隆	其他	0.01*	殺蟲劑
54	Dimethomorph 達滅芬	葡萄	1.0	殺菌劑
55	Dinitramine 達乃安	其他	0.01*	殺草劑
56	Dinotefuran 達特南	葡萄	1.0	殺蟲劑
57	Diphenamid 大芬滅	其他	0.01*	殺草劑
58	Dithianon 腈硫脒	葡萄	0.2	殺菌劑
59	Dithiocarbamate 二硫代胺基	小漿果類	5.0	殺菌劑
60	Diuron 達有龍	葡萄	0.05	殺草劑
61	Edifenphos 護粒松	其他	0.01*	殺菌劑
62	Endosulfan 安殺番	葡萄	0.4	殺蟲劑
63	Ethephon 益收生長素	小漿果類	2.0	生長調節劑
64	Ethion 愛殺松	小漿果類	0.5	殺蟎劑
65	Ethirimol 依瑞莫	小漿果類	2.0	殺菌劑
66	Ethoprophos 普伏松	小漿果類	0.02	殺線蟲劑
67	Etoxazole 依殺蟎	葡萄	0.5	殺蟎劑
68	Famoxadone 凡殺同	葡萄	2.0	殺菌劑
69	Fenamidphos 芬滅松	小漿果類	0.1	殺線蟲劑
70	Fenarimol 芬瑞莫	小漿果類	0.5	殺菌劑
71	Fenazaquin 芬殺蟎	其他	0.01*	殺蟎劑
72	Fenbutatin 芬佈賜	葡萄	5.0	殺蟎劑
73	Fenhexamid 葡萄	4.0	殺菌劑	
74	Fenitrothion 撲滅松	葡萄	0.2	殺蟲劑
75	Fenobucarb 丁基滅必靈	其他	0.01*	殺蟲劑
76	Fenpropathion 芬普寧	葡萄	1.0	殺蟲劑
77	Fenpyroxin 芬普蟎	小漿果類	0.5	殺蟎劑
78	Fenthion 芬殺松	其他	0.02*	殺蟲劑
79	Fenvalerate 芬化利	小漿果類	1.0	殺蟲劑
80	Fipronil 芬普尼	其他	0.001*	殺蟲劑
81	Flazasulfuron 伏速隆	葡萄	0.2	殺草劑
82	Flucythriner 護賽寧	其他	0.05*	殺蟲劑
83	Fludioxonil 護汰寧	葡萄	2.0	殺菌劑
84	Flufenoxuron 氟芬隆	其他	0.01*	殺蟲劑
85	Fluopicolide 氟比來	葡萄	2.0	殺菌劑
86	Flusilazole 護砂得	小漿果類	0.5	殺菌劑
87	Flutolanil 福多寧	其他	0.01*	殺菌劑
88	Flutriafol 護汰芬	葡萄	0.2	殺菌劑
89	Fluvalinate 福化利	小漿果類	1.0	殺蟲劑
90	Fosetyl-Al 福賽得	其他小漿果	20.0	殺菌劑
91	Gibberellic acid 勃激素A3	小漿果類	5.0	生長調節劑
92	Glufosinate 固殺草	其他小漿果	0.1	殺草劑
93	Glyphosate 嘉磷塞	小漿果類	0.2	殺草劑
94	Halfenprox 合芬寧	其他	0.05*	殺蟎劑
95	Heptenoph 飛達松	小漿果類	0.5	殺蟲劑
96	Hexaconazole 菲克利	小漿果類	1.0	殺菌劑
97	Hexaflumaz 六伏隆	其他	0.05*	殺蟲劑
98	Hexythiazole 合賽多	小漿果類	1.0	殺蟎劑
99	Imibenconazole 易胺座	小漿果類	0.5	殺菌劑
100	Imidacloprid 益達胺	小漿果類	1.0	殺蟲劑
101	Iminoctadiazine 克熱淨(醋醃)	葡萄	1.0	殺菌劑
102	Indoxacarb 因得克	其他	0.01*	殺蟲劑
103	Iprobenfos 丙基喜樂松	其他	0.03*	殺菌劑

葡萄 農藥殘留安全容許量

104	Iprodione 依普同	小漿果類	5.0	殺菌劑
105	Isofenphos 亞芬松	其他	0.01*	殺蟲劑
106	Isoprothiol 亞賜爾	其他	0.02*	殺菌劑
107	Isouron 愛速隆	小漿果類	0.5	殺草劑
108	Isoxathion 加福松	其他	0.02*	殺蟲劑
109	Kresoxim-r 克收欣	小漿果類	5.0	殺菌劑
110	Lufenuron 祿芬隆	其他	0.01*	殺蟲劑
111	Malathion 馬拉松	其他	0.01*	殺蟲劑
112	MALS 滅紋	小漿果類	0.5	殺菌劑
113	Mandiprop. 曼普胺	葡萄	1.0	殺菌劑
114	Mefenacet 滅芬草	其他	0.01*	殺草劑
115	Mepanipyri 滅派林	葡萄	3.0	殺菌劑
116	Mepronil 滅普寧	小漿果類	2.0	殺菌劑
117	Metaxyl 滅達樂	葡萄	2.0	殺菌劑
118	Methidathion 滅大松	小漿果類	0.1	殺蟲劑
119	Methiocarb 滅賜克	小漿果類	0.2	殺蟲劑
120	Methomyl 納乃得	小漿果類	2.0	殺蟲劑
121	Metolachlo 莫多草	其他	0.01*	殺草劑
122	Metolcarb 治滅蝨	其他	0.01*	殺蟲劑
123	Metrafenor 滅芬農	葡萄	2.0	殺菌劑
124	Metribuzin 滅必淨	其他	0.05*	殺草劑
125	Milbemecti 密滅汀	小漿果類	0.2	殺蟲劑
126	Molinate 稻得壯	其他	0.01*	殺草劑
127	Myclobutan 邁克尼	葡萄	1.0	殺菌劑
128	Napropami 滅落脫	其他	0.01*	殺草劑
129	Norflurazon	葡萄	0.1	除草劑
130	Nuarimol 尼瑞莫	其他	0.05*	殺菌劑
131	Omethoate 歐滅松	小漿果類	0.2	殺蟲劑
132	Oxadiazon 樂滅草	其他	0.01*	殺草劑
133	Oxadixyl 歐殺斯	小漿果類	1.0	殺菌劑
134	Oxamyl 歐殺滅	其他	0.01*	殺蟲劑
135	Oxine-cop 快得寧	小漿果類	2.0	殺菌劑
136	Oxycarbox 嘉保信	小漿果類	2.0	殺菌劑
137	Oxyfluorfer 復祿芬	葡萄	0.03	殺草劑
138	Paclobutra 巴克素	小漿果類	0.5	生長調節劑
139	Paraquat 巴拉刈	葡萄	0.01	殺草劑
140	Parathion-r 甲基巴拉松	其他	0.01*	殺蟲劑
141	Penconaz 平克座	小漿果類	0.5	殺菌劑
142	Pencycuro 賓克隆	其他	0.01*	殺菌劑
143	Pendimeth 施得圃	其他	0.01*	殺草劑
144	Permethrin 百滅寧	小漿果類	1.0	殺蟲劑
145	Phenthoate 賽達松	其他	0.02*	殺蟲劑
146	Phorate 福瑞松	小漿果類	0.05	殺蟲劑
147	Phosmet 益滅松	其他	0.02*	殺蟲劑
148	Pirimicarb 比加普	其他	0.01*	殺蟲劑
149	Pirimiphos 亞特松	其他	0.01*	殺蟲劑
150	Pretilachlor 普拉草	其他	0.05*	殺草劑
151	Prochloraz 撲克拉	小漿果類	1.0	殺菌劑
152	Procymidol 撲滅寧	小漿果類	5.0	殺菌劑
153	Profenoph 佈飛松	其他	0.02*	殺蟲劑
154	Propamoc 普拔克	葡萄	9.0	殺菌劑
155	Propanil 除草靈	其他	0.01*	殺草劑

葡萄 農藥殘留安全容許量

156	Propaphos 加護松	其他	0.01*	殺蟲劑
157	Propiconaz 普克利	其他	0.03*	殺菌劑
158	Propoxur 安丹	其他	0.01*	殺蟲劑
159	Prothiofos 普硫松	小漿果類	0.2	殺蟲劑
160	Pyraclostro 百克敏	葡萄	2.0	殺菌劑
161	Pyrazopho 白粉松	其他	0.05*	殺菌劑
162	Pyridaben 畢達本	葡萄	1.0	殺蟎劑
163	Pyridapher 必芬松	其他	0.10*	殺蟲劑
164	Pyrifeno 比芬諾	其他	0.03*	殺菌劑
165	Pyrimethar 派美尼	葡萄	4.0	殺菌劑
166	Pyriproxyfe 百利普芬	小漿果類	0.5	殺蟲劑
167	Pyroquilon 百快隆	其他	0.01*	殺菌劑
168	Quinoxifer 快諾芬	葡萄	2.0	殺菌劑
169	Quizalofop 快伏草	其他	0.01*	殺草劑
170	Sethoxydin 西殺草	葡萄	1.0	殺草劑
171	Silafluofen 矽護芬	小漿果類	2.0	殺蟲劑
172	Simazine 草滅淨	葡萄	0.2	殺草劑
173	Spinosad 賜諾殺	葡萄	0.5	殺蟲劑
174	Spirotetran 賜派滅	葡萄	2.0	殺蟎劑
175	Tebuconaz 得克利	葡萄	2.0	殺菌劑
176	Tebuconaz 得芬諾	葡萄	2.0	殺蟲劑
177	Tebuconpy 得芬瑞	葡萄	0.5	殺蟎劑
178	Teflubenzu 得福隆	其他	0.01*	殺蟲劑
179	Tetraconaz 四克利	小漿果類	0.5	殺菌劑
180	Tetramethr 治滅寧	其他	0.01*	殺蟲劑
181	Thiabendaz 腐絕	小漿果類	5.0	殺菌劑
182	Thiametho 賽速安	葡萄	0.3	殺蟲劑
183	Thiobencal 殺丹	其他	0.01*	殺草劑
184	Thiodicarb 硫敵克	小漿果類	0.5	殺蟲劑
185	Triadimefo 三泰芬	小漿果類	0.5	殺菌劑
186	Triadimenc 三泰隆	小漿果類	2.0	殺菌劑
187	Triazophos 三落松	其他	0.02*	殺蟲劑
188	Trichlorfon 三氯松	其他	0.05*	殺蟲劑
189	Trifloxystro 三氟敏	葡萄	2.0	殺菌劑
190	Triflumizole 賽福座	小漿果類	1.0	殺菌劑
191	Trifluralin 三福林	葡萄	0.05	殺草劑
192	Vamidothic 繁米松	小漿果類	0.5	殺蟲劑
193	Vinclozolin 免克寧	小漿果類	2.0	殺菌劑

政府歷年禁用農藥一覽表

項次	農藥名稱	英文名稱	禁止製造、禁止銷售、使用日期
1	一品松	ENP	八十五年十八十七年八月一日
2	二溴乙烷	EDB	七十三年二
3	二溴氯丙烷	DBCP	七十年六月
4	三苯錫	TPTH	八十六年九八十八年元月一日
5	三苯錫	TPTA	八十六年九八十八年元月一日
6	大脫蟎	Dinobuton	八十年五月八十年十二月一日
7	五氯酚鈉	PCP-Na	七十二年七七十三元月十九日
8	五氯硝苯	PCNB	七十八年七七十九年七月一日
9	加芬松	Carbophen	九十二年六九十二年六月三日
10	可力松	Conen	九十二年六九十二年六月三日
11	四氯丹	Captafol	七十六年七十七年十月一日
12	甲基滅賜松	Demephior	九十二年六九十二年六月三日
13	白粉克	Dinocap	七十九年五七十九年十二月三十一日
14	全滅草	Chlornitrofi	輸入：八十八十六年元月一日
15	地特靈	Dieldrin	六十四年元六十四年十月一日
16	安特靈	Endrin	六十年元月六十一元月一日
17	有機水銀	Organic m	六十年十月六十一元月二十五日
18	百蟎克	Binapacryl	九十年七月九十年七月一日
19	西脫蟎	Benzoxima	九十二年六九十二年六月三日
20	克氯苯	Chloroben	七十二年九七十二年九月二十一日
21	克氯蟎	Chlorophyl	九十二年六九十二年六月三日
22	亞拉生	Daminozid	七十八年六七十九年元月一日
23	亞環錫	Azocyclotir	八十六年九八十八年元月一日
24	固嚴寧	Glyodin	九十二年二九十二年二月二十五日
25	阿特靈	Aldrin	六十四年元六十四年十月一日
26	毒殺芬	Toxaphene	七十二年七七十三元月十九日
27	美福松	Mephosfol	九十二年六九十二年六月三日
28	飛佈達	Heptachlor	六十四年元六十四年十月一日
29	益多松	Etrimfos	九十二年二九十二年二月二十五日
30	能死蟎	MNFA (Nis	八十五年七八十八年十一月一日
31	得拉松	Dialifos	九十二年六九十二年六月三日
32	得脫蟎	Tetradifon	八十二年十八十五年七月一日
33	得氯蟎	Dienochlor	八十五年十八十七年八月一日
34	得滅多	Buthiobate	九十二年六九十二年六月三日
35	得滅克	Aldicarb	八十年十月八十一元月一日
36	殺力松	Salithion	九十二年六九十二年六月三日
37	殺佈蟎	Cycloprate	九十二年二九十二年二月二十五日
38	殺蟎多	smite	九十二年六九十二年六月三日
39	普得松	Ditalimfos	九十二年六九十二年六月三日
40	普滅克	Promecarb	九十二年二九十二年二月二十五日
41	氰乃淨	Cyanazine	七十六年七十七年七月一日
42	滅蘇民	Aziprotryne	九十二年二九十二年二月二十五日
43	溴化甲烷	Methyl Bro	九十二年四月一日
44	溴磷松	Bromophos	九十二年六九十二年六月三日
45	達諾殺	Dinoseb	七十五年七十五年十二月二十日
46	滴滴	Dichloropr	七十六年七七十六年七月九日
47	滴滴涕	DDT	六十二年七六十三元月一日
48	福木松	Formothior	九十二年七九十五年一月一日
49	福爾培	Folpet	七十八年七七十九年七月一日
50	福賜松	Leptophos	六十六年六十七元月一日
51	樂乃淨	Fenchlorph	七十六年九七十六年九月二日

52	賜加落	Pyracarb	九十三年二九十三年二月二十五日
53	鋅乃浦	Zineb	八十六年九八十八年元月一日
54	錫蟠丹	Cyhexatin	七十八年七七十九年七月一日
55	繁福松	Fensulfothi	九十二年六九十二年六月三日
56	蟲必死	BHC	六十四年元六十四年十月一日
57	護谷、護谷	Nitrofen	七十年元月七十二元月一日
58	靈丹	γ-BHC (Lin	七十三年八七十四年二月一日